



Fragata®

**TRICHODERMA HARZIANUM / FUNGICIDA BIOLÓGICO
POLVO HUMECTABLE**

Fungicida biológico para el control de hongos presentes en suelo

FRAGATA® Es un fungicida biológico formulado con *Trichoderma harzianum* que actúa inhibiendo el crecimiento de hongos fitopatógenos a través de mecanismos tales como competencia por espacio y nutrientes, micoparasitismo y antibiosis.

| INGREDIENTE ACTIVO: | % p/p |
|---|--------------|
| <i>Trichoderma harzianum</i> (Equivalente a 50 g de i.a./Kg con una concentración de 1×10^9 UFC/g) | 5.0 |
| INGREDIENTES INERTES: | |
| Medio nutritivo y dispersantes | 95.0 |
| TOTAL | 100.0 |

REG.: RSCO-FUNG-0301B-0526-002-5.0

INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVO | INTERVALO DE SEGURIDAD | PLAGA | DOSIS Kg/ha | OBSERVACIONES |
|---|------------------------|---|----------------|---|
| JITOMATE CHILE CHILE BELL TOMATE DE CASCARA BERENJENA TABACO | SIN LIMITE | Pudrición radical <i>(Fusarium oxysporum)</i> | 3.0 | Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 13 días en drench, iniciar la aplicación en el transplante: volumen de aplicación 40 mL/planta. |

Tiempo de reentrada a la zona tratada: Una vez que seque el producto.

() **Intervalo de Seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL = Sin Límite

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Rompa la esquina superior izquierda con unas tijeras (nunca con la boca), procurando no entrar en contacto directo con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad, posteriormente agregue **FRAGATA**[®] y termine de llenar con agua. Se aplica en drench con suficiente cantidad de agua. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla.

CONTRAINDICACIONES

Aplicar **FRAGATA**[®] en condiciones climáticas favorables, no en horas de máxima insolación. No aplicar si se pronostica lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. No aplicar con velocidad de viento superior a los 10 km/hora. Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar **FRAGATA**[®] con otros plaguicidas.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado en el manejo, preparación y aplicación del producto (camisa de manga larga y pantalón largo, goggles o lentes, guantes de caucho, nitrilo o neopreno, zapatos y calcetines).

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación no induzca el vómito. Llame al médico. Si hay contacto con los ojos lave con abundante agua limpia la zona de contacto. Si hay contacto con la piel lave con abundante agua limpia y jabón la zona de contacto.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUIMICO: Hongo antagonista *Trichoderma harzianum*. Signos y síntomas de intoxicación: no se conocen intoxicaciones por el ingrediente activo de **FRAGATA®**. Dar tratamiento sintomático.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:

AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



An American Vanguard Company

Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670

Tel: 01 (33) 3110 1976

01 800 00 AMVAC (26822)

www.amvac.c.om.mx