



PIRETRINA NATURAL / INSECTICIDA-ACARICIDA POLVO HUMECTABLE

Ayuda al control de insectos y ácaros con un excelente efecto de derribe contra chupadores.

Portrin. Es un insecticida de origen botánico a base de piretrinas naturales que actúa por contacto e ingestión. Tiene efecto de derribe contra chupadores (vectores de virus y fitoplasmas) y un excelente control sobre araña roja sin afectar el manejo sustentable de los cultivos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Piretrina: Extracto de piretro	0.2 %
Ingredientes inertes:	
Humectante, dispersantes y portadores	99.8%
Total	100 %

Registro No.: RSCO-INAC-01011-329-002-0.20

INSTRUCCIONES DE USO

PORTRIN® es un insecticida del grupo de las piretrinas naturales que actúa por contacto o ingestión, formulado como polvo humectable, recomendado para el control de la plaga que se indica en los siguientes cultivos:

APLICACIÓN FOLIAR:

Cultivo		Plaga	Dosis
Calabacita (SL) Melón (SL)	Pepino (SL) Sandía (SL)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5 – 3 kg/ha Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Arándano (SL) Fresa (SL) Frambuesa (SL)	Grosella (SL) Zarzamora (SL)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 – 3 kg/ha Realizar dos aplicaciones de 950-1050 L de agua / ha al follaje, a intervalo de 7 días.
Aguacate (SL)		Trips (<i>Scirtothrips perseae</i>)	1.5 – 3 kg/ha Realizar dos aplicaciones de 750-850 L de agua / ha al follaje, a intervalo de 7 días.
Cidro (SL) Limón (SL) Mandarina (SL)	Naranja (SL) Pomelo (SL) Toronjo (SL)	Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1 – 2 kg/ha Realizar dos aspersiones de 230-330 L de agua/ha al follaje, a intervalo de 7 días.
Brócoli (SL) Col (SL) Col de Bruselas (SL)	Coliflor (SL) Rábano (SL)	Pulgón cenizo (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	1.5 – 2.5 kg/ha Realizar dos aspersiones de 230-330 L de agua/ha al follaje, a intervalo de 7 días.
Berenjena (SL) Chile (SL) Jitomate (SL)	Tomate de cáscara (SL) Papa (SL) Pimiento (SL)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 – 2.5 kg/ha Realizar dos aspersiones de 230-330 L de agua/ha al follaje, a intervalo de 7 días.

Intervalo de seguridad: (SL) Sin límite.

Tiempo de reentrada a lugares tratados: 12 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

PORTRIN® se diluye en agua y se aplica con aspersoras manuales o motorizadas. Se deberá usar tanta agua como sea necesario para tener un buen cubrimiento del follaje. Las dosis anteriores deberán ajustarse según la infestación, tamaño del cultivo y las características del equipo de aplicación.

CONTRAINDICACIONES

No hacer aplicaciones en horas de calor intenso, si la velocidad del viento es alta (más de 10 km/hora), o si existe alta probabilidad de lluvia. No pastorear ganado en áreas tratadas.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos. Las mezclas serán con productos registrados en los cultivos indicados.

INCOMPATIBILIDAD

PORTRIN® no es compatible con productos de reacción alcalina.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección personal completo y adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, googles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Evite derrames accidentales y en caso de tenerlos, utilizar materiales como aserrín para absorción

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.

Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

Si se ingiere: Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO GRUPO QUÍMICO

Piretrinas naturales. **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Nerviosismo, ansiedad, alergia a la piel, estornudos. A pesar de que el producto tiene baja toxicidad, en caso de ingestión accidental o intencional, puede causar desórdenes digestivos, náuseas, diarrea o vómito. **ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:** No existe tratamiento específico. Dar al paciente tratamiento sintomático

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:

AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



An American Vanguard Company

Alcama 3070, Col. Prados de Providencia
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670

Tel: 01 (33) 3110 1976

01 800 00 AMVAC (26822)

www.amvac.c.om.mx