

# SeaMaster<sup>®</sup> 400

MEJORADOR DE SUELO

## FERTILIZANTE ORGÁNICO-MINERAL

### LÍQUIDO

Promueve una mayor y más eficiente actividad metabólica en tus cultivos en sus diversas etapas fenológicas.

**SEAMASTER<sup>®</sup>**. Es un fertilizante órgano-mineral elaborado a base de extractos de algas marinas concentrado (*Ascophyllum nodosum*) adicionado con Zinc, Hierro y Boro, con su aplicación se promueve el proceso de la división y diferenciación celular, estimula el crecimiento de raíces, hojas, flores o frutos. Ayuda a los cultivos a obtener mejores rendimientos así como a superar situaciones de estrés dadas por condiciones climáticas adversas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	
MATERIA ORGÁNICA	13.50%
NITRÓGENO	2.00%
FÓSFORO (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	0.005%
POTASIO (K <sub>2</sub> O)	5.0%
AZUFRE (S)	0.20%
BORO (B)	1.50%
ZINC (Zn)	1.00%
HIERRO (Fe)	2.00%
CALCIO (CaO)	100 mg/kg
MAGNESIO (MgO)	850 mg/kg
COBRE (Cu)	55 mg/kg
MANGANESO (Mn)	100 mg/kg
AUXINA	400 ppm

Registro No.: RSCO 048/III/18

## INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS (lt/ha)	Observaciones
Chile, Jitomate, Tomate de cáscara, Berenjena, Col, Coliflor, Brócoli, Cebolla, Lechuga, Cilantro, Apio, Rábano, Ajo, Acelga, Zanahoria, Espárrago.	1.25 – 1.75	<b>Realizar tres aplicaciones:</b> 1) 5 días posteriores al transplante, 2) 20 días después de transplante, 3) 35 días después de transplante. Aplicar a través de fertirrigación, drench o foliar.
Melón, Sandía, Pepino, Calabaza, Calabacita	1.25 – 1.75	<b>Realizar tres aplicaciones:</b> 1) 10 días posteriores a la germinación del cultivo, 2) 25 días después de germinación, 3) 40 días después de germinación. Aplicar a través de fertirrigación, drench o foliar.
Papa	5 ml/lt agua en papa semilla  1.25 – 1.75 lt/ha en planta	Aplicar directamente sobre la semilla de papa en el surco antes de tapar. Aplicar por segunda vez en drench o foliar a los 15 días posteriores.
<b>FRUTALES:</b> Aguacate, Cítricos, Mango y Papaya	1 - 2	Primera aplicación a inicios del temporal continuando con dos aplicaciones más cada 45-60 días entre una y otra.
<b>BERRIES:</b> Fresa, frambuesa, zarzamora y arándano.	1 - 2	Primera aplicación 5 días después del transplante o en la brotación, una segunda aplicación 1 mes después y una tercera al inicio de floración.

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO

Calibre su equipo antes de la aplicación. Revise que el envase se encuentra en perfectas condiciones antes de abrirlo.

**SEAMASTER®** se recomienda aplicarlo de vía suelo, por fertirrigación o drench.

### INCOMPATIBILIDAD

**SEAMASTER®** solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad con otros productos antes de mezclar y previo a la aplicación en campo.



**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Si hay contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. **Si hay contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento. **Si se ingiere:** Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente. **Si se inhala:** Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento.

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SIN TOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:

**AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**



An American Vanguard Company

Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia  
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670

Tel: 01 (33) 3110 1976

01 800 00 AMVAC (26822)

[www.amvac.c.om.mx](http://www.amvac.c.om.mx)