INSECTICIDA
GRANULADO

Ambush® 0.8 G
INSECTICIDA

Permetrina

Ambush®0.8 G Insecticida piretroide granulado que actúa por contacto e ingestión; interfiere sobre los canales de sodio, interrumpiendo la transmisión del impulso nervioso, causando parálisis y la posterior muerte del insecto. También posee efecto repelente. Alta eficacia contra larvas de lepidópteros.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	**% EN PESO**
Ingredientes activos:	
Permetrina: 3-fenoxibencil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2, 2-dimetilciclopropano carboxilato (Equivalente a 8 g de i.a./ kg)	0.80
Ingredientes inertes:	
Disolventes, colorante, fluidizante y portador.	99.20
Total:	100.00

Registro Sanitario No.: RSCO-INAC-0156-X1150-005-0.8

INSTRUCCIONES DE USO

Ambush®0.8 G es un insecticida larvicida que actúa por ingestión y contacto. Hacer la aplicación dirigida al cogollo de la planta cuando se detecten las primeras larvas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/ha	OBSERVACIONES
Maíz (1)	**Gusano cogollero** *(Spodoptera frugiperda)*	5.0 - 12.0	Realizar una aplicación al follaje, dirigida al cogollo de la planta.

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PERIODO DE INGRESO: No entre ni permita que otras personas entren en el área aplicada sin el equipo de protección adecuado por un periodo de 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Utilizar el equipo de protección personal que se señala en el apartado “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. Con el equipo de protección personal puesto, coloque el saco en posición vertical y abra con la ayuda de una navaja o tijeras. Debido a que **Ambush®0.8 G** es un producto granulado, está listo para usarse. Calibre su equipo de aplicación para lograr una distribución homogénea del producto.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Mochila manual o motorizada o botella con aplicador de tipo “salero”.

CONTRAINDICACIONES: No deje producto en las aplicadoras. Aplique todo el producto depositado en el equipo de aplicación.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **Ambush®0.8 G** con otros productos. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE LA RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

Insecticida AMBUSH® 0.8 G
IRAC MoA Grupo 3 Moduladores de los canales de sodio, subgrupo 1A Piretroides
Acción nerviosa
Permetrina 0.80% equivalente a 8 g de i.a. / kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o vapores, lentes de seguridad para productos químicos y/o careta protectora, guantes, overol y botas de hule. El equipo de protección personal se deberá almacenar en el lugar de trabajo. Evite inhalar la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que el rocío caiga sobre la piel durante la aplicación. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Al final de la jornada báñese y póngase ropa limpia. Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame al médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado, mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si hay contacto con los ojos: En caso de contacto, mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de envenenamiento o a un médico para el tratamiento.
Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.
Si se ingiere: Llame al centro de control de envenenamiento o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona beba un vaso de agua si está en posibilidad de ingerir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de envenenamientos o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.
Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. En caso de brindar respiración artificial si la persona no respira, ésta deberá ser realizada por personal previamente capacitado tomando las debidas precauciones: la respiración artificial se debe proporcionar con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración. No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió la sustancia. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.
Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al doctor para el tratamiento.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Ambush®0.8 G contiene permetrina como ingrediente activo, el cual pertenece al grupo químico de los piretroides.
Signos y síntomas de intoxicación: Puede provocar los siguientes síntomas: **Por vía oral:** convulsiones, temblores, ansiedad, alergias, malestares gástricos, anorexia, alteraciones de la conciencia, pérdida del conocimiento, náuseas y vómitos. **Por vía inhalatoria:** tos, irritación del tracto respiratorio, cefaleas, episodios asmáticos y dificultad respiratoria. **Por vía dérmica:** enrojecimiento de la piel, sensación de quemazón y picor. **Por contacto con los ojos:** enrojecimiento y dolor en los ojos.

Tratamiento: No hay antídoto específico, el tratamiento médico es sintomático y de sostén. Efectuar lavado gástrico, evite la aspiración de los contenidos gástricos. En caso de irritación cutánea, lavar con jabón y aplicar vaselina para mitigar el escozor.

INSECTICIDA
GRANULADO

Ambush® 0.8G
INSECTICIDA

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS (55) 5598-6659, (55) 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:
AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.
AMVAC®
An American Vanguard Company
Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010
Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)

www.amvac.com.mx
amvacmexico amvac mexico

AUT-B0819