

Ayuda a estimular el crecimiento vegetativo e incrementa la resistencia en condiciones desfavorables.

Amcotone® es una hormona reguladora de crecimiento (auxina) que ayuda en el amarre del fruto y estimula el desarrollo de la planta. Las auxinas en la planta se localizan generalmente en los puntos de crecimiento más activo.

INGREDIENTES ACTIVO:	% EN PESO
1-naftalenacetamida (Equivale a 12g de i.a/kg)	1.20
1-ácido naftalenacético (Equivale a 4.5g de i.a/kg)	0.45

Registro: RSCO-049 / VI / 01.

INSTRUCCIONES DE USO

Amcotone® puede ser usado para estimular el crecimiento vegetativo y para incrementar la resistencia en condiciones desfavorables, por ejemplo se recomienda además en las etapas de crecimiento vegetativo, durante la floración para el amarre del fruto y en la primera etapa de fructificación.

APLICACIÓN FOLIAR:

CULTIVO	OBSERVACIONES
Calabaza Calabacita Melón Jitomate Chile	La primera aplicación puede ser efectuada al principio de la floración y repetirse cada 7-10 días durante el periodo de floración, puede efectuarse en un promedio de 3 a 4 aplicaciones. Puede efectuarse una aplicación temprana en la fase intermedia y tardía de la etapa de floración y una última en la etapa temprana de fluctuación.
Uvas	Aplicar dosis de 2 ppm a las 4 semanas y a las 2 semanas antes de cosechar.
Pera Manzana Durazno Ciruelo	Efectuar la primera aplicación 2 semanas después de la floración y repetir 2 o 3 veces con un intervalo de 10 a 12 días y la última aplicación hacerla antes de la caída de las hojas. Hacer una aplicación tan pronto como sea posible antes de que se presenten el periodo de heladas y una segunda aplicación a 6-8 días después.
Frijol Berenjena Fresa	Efectuar la primera aplicación cuando la planta se encuentra en estado de formación de la 2a y 3a hoja. Cuando se trate de cultivos de trasplante comenzar las aplicaciones a los 8 – 10 días después del trasplante. Efectuar la primera aplicación cuando la planta se encuentra en estado de formación de la 2a y 3a hoja. Cuando se trate de cultivos de trasplante comenzar las aplicaciones a los 8 – 10 días después del trasplante. Efectuar la primera aplicación cuando la planta se encuentra en estado de formación de la 2a y 3a hoja.

CULTIVO	OBSERVACIONES
Frijol Berenjena Fresa	Cuando se trate de cultivos de trasplante comenzar las aplicaciones a los 8 – 10 días después del trasplante.
Chicharo	Efectuar la primera aplicación cuando la planta se encuentra en estado de formación de la 2a y 3a hoja. Cuando se trate de cultivos de trasplante comenzar las aplicaciones a los 8 – 10 días después del trasplante.
Sandía	Efectuar la primera aplicación cuando la planta se encuentra en estado de formación de la 2a y 3a hoja. Cuando se trate de cultivos de trasplante comenzar las aplicaciones a los 8 – 10 días después del trasplante.
Pimienta	Efectuar la primera aplicación cuando la planta se encuentra en estado de formación de la 2a y 3a hoja. Cuando se trate de cultivos de trasplante comenzar las aplicaciones a los 8 – 10 días después del trasplante.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Amcotone® Prepare la solución mezclando la cantidad requerida del producto con agua solamente, en un tanque de aspersión vacío y limpio.

Para mejores resultados, las aplicaciones deben hacerse durante las horas más frescas del día.

Úselo siempre siguiendo las instrucciones. Deben seguirse métodos correctos de aspersión. Las etiquetas deben ser leídas cuidadosamente y bien entendidas antes de hacer las aplicaciones. Para que el producto sea efectivo se requiere que todas las partes de la planta reciban la aspersión o no se obtendrán los resultados deseados. Por lo tanto, la aspersión debe cubrir completamente. Cuando las cantidades recomendadas fluctúan, use la cantidad y el volumen de la aspersión recomendados localmente. Al final de cada día, desechar la porción no usada de la aspersión

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

El manejo de este producto use el equipo de protección completo (gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol, goggles, guantes y botas de neopreno); no coma, no beba o fume durante el manejo de este producto: después de un día de trabajo báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Se violan las Leyes Federales si se usa este producto en maneras inconsistentes con las recomendaciones de las etiquetas. Cuando aplique este producto no exponga a los trabajadores u otras personas directamente o personas no protegidas.

EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO.

REGULADOR DE CRECIMIENTO SINTÉTICO
POLVO HUMECTABLE



PRIMEROS AUXILIOS:

SI HAY CONTACTO CON LOS OJOS: Inmediatamente lávese con agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.

SI ES INGERIDO: Tomar leche en gran cantidad o agua. Busque inmediatamente atención médica.

SI ES INHALADO: Ponga a la persona intoxicada en un lugar ventilado y a la sombra.

SI HAY CONTACTO CON LA PIEL: Remover la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón, si la irritación persiste consulte al médico.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 55 5598-6659, 55 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 800-009-2800.

O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).



Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010
Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)

HECHO EN MÉXICO

www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](#) [in amvac mexico](#)