

Fungicida de efecto curativo, erradicante y preventivo que actúa sobre los hongos patógenos de forma sistémica y de contacto. Se adhiere a la superficie de las hojas y se mueve de manera acrópetala, sobre los hongos incide en la biosíntesis de la membrana celular del hongo inhibiendo la síntesis de ergosterol, con lo que limita su crecimiento y esporulación.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:		% EN PESO
Ingrediente activo:		
Tebuconazol: (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol (Equivalente a 250 g/L de i.a. a 20°C)		24.36
Ingredientes Inertes:		
Emulsificantes, Anticongelante y Solventes.		75.64
	Total:	100.00

Registro: RSCO-FUNG-0349-X0333-345-24.36

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Plátano (SL)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.35 – 0.45	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 672-715 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Tomate verde (14)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	0.5 – 1.0	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Tomate verde, Pimiento (14)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.5 – 1.0	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al detectar el inicio de infección de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 429-434 L de agua/ha.
Trigo, Cebada, Triticale, Centeno (SL)	Roya Lineal Amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.40 – 0.50	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 6 días, al observar los primeros síntomas; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha

() Intervalo de Seguridad: Días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 Horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con

agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria **ROGATONE® 250 EW** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta. Es fitotóxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que no son objeto de control, por lo que se debe evitar que la aspersión caiga sobre su cultivo o cultivos aledaños.

INCOMPATIBILIDAD:

No se recomienda **ROGATONE® 250 EW** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

Fungicida ROGATONE® 250 EW
MoA FRAC grupo 3 (Código FRAC: 3)
Inhibidores de la desmetilación (DMI)
Tebuconazol 24.36% equivalente a 250 g i.a./L.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado, incluyendo gorra impermeable, guantes y botas de neopreno, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, mascarilla con filtro contra polvos y vapores, así como lentes de seguridad con protección hermética lateral. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral lavándolo con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común, y almacenar junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. **En caso de contacto con los ojos:** Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico. **En caso de contacto con la piel:** Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación dar atención médica. **En caso de ingestión:** Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Triazol.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de ingestión puede causar vómito, diarrea y convulsiones; En caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación de la piel y ojos; En caso de inhalación puede causar irritación del tracto respiratorio, debilidad y mareo.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No hay antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 55 5598-6659, 55 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 800-009-2800.
O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010
Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](https://www.facebook.com/amvacmexico) [in amvac mexico](https://www.linkedin.com/company/amvac-mexico)