

SPIROTETRAMAT + ABAMECTINA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA



Insecticida mezcla de spirotetramat y abamectina, con sistemía acro y basipetala, además de efecto traslaminar; que actúa por ingestión y contacto en el control de un amplio espectro de plagas de insectos, entre los que se incluyen moscas blancas, pulgones, psílidos, trips y ácaros. Tiene efecto sobre estados inmaduros y adultos, además de provocar menor fertilidad y fecundidad en hembras de las mismas plagas.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Ingrediente activo:	
Spirotetramat: cis-4-(etoxicarbonilo)-8-metoxi-3-(2,5-xilil)-1-azaspiro[4.5] dec-3-en-2-ona (Equivalente a 240 g/L de i.a. a 20°C)	22.94
Abamectina: Mezcla de Avermectina B1a y Avermectina B1b (contenido no menos de 94.12% de Avermectina B1a y no más de 2.6% de Avermectina B1b) (Equivalente a 40 g/L de i.a. a 20°C)	3.82
Ingredientes Inertes:	
Agentes dispersantes / humectantes, antiespumante, agente anticongelante, modificador estructural, agente espesante, conservador y solvente.	73.24
TOTAL:	100.00

Registro: RSCO-MEZC-INAC-0103Z-0174-X0157-064-26.76

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGAS NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOSIS mL/ha	RECOMENDACIONES
Calabacita, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía (3)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	250 – 300	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, dirigida al envés de las hojas para un mejor control; volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Tomate de Cáscara (3)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	275 – 400	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, dirigidas al envés de la hoja, iniciar al observar los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 600L de agua/ha.
Arándano, Frambuesa, Grosella, Zarzamora (3)	Trips occidental de las flores (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	200 – 400	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, dirigidas al envés de la hoja, iniciar al observar los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.
Aguacate (14)	Trips del aguacate (<i>Scirtothrips perseae</i>)	100 – 300 mL/1000 L de agua	Realizar 2 aplicaciones foliares de 7 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 1000 L de agua/ha.

SPIROTETRAMAT + ABAMECTINA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA



CULTIVO	PLAGAS NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOSIS mL/ha	RECOMENDACIONES
Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Toronjo (7)	Araña roja de los cítricos (<i>Panonychus citri</i>)	150 – 250 mL/1000 L de agua	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga en el cultivo. Volumen de aplicación sugerido 550 – 650 L de agua/ha.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 Horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **ABInsect™** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta. Es fitotóxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que no son objeto de control, por lo que se debe evitar que la aspersión caiga sobre su cultivo o cultivos aledaños.

INCOMPATIBILIDAD:

No se recomienda **ABInsect™** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

Insecticida ABInsectTM

IRAC MoA Grupo 23. Inhibidores de la biosíntesis de lípidos.

Spirotetramat 22.94% equivalente a 240 g i.a./L.

**IRAC MoA Grupo 6. Activadores de los canales de cloro
regulados por glutamato**

Abamectina 3.82% equivalente a 40 g i.a./L.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo gorra impermeable, lentes químicos con protección hermética lateral, guantes y botas de neopreno, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, mascarilla con filtro contra polvos y vapores tóxicos. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral lavándolo con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común, y almacenar junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. **En caso de contacto con los ojos:** Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico. **En caso de contacto con la piel:** Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación dar atención médica. **En caso de ingestión:** Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Abamectina: Avermectina; Spirotetramat: Ácido tetrámico.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de ingestión puede causar malestar estomacal, náuseas, vómitos, daño renal y hepático. En caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación y enrojecimiento. En caso de inhalación puede causar somnolencia, tos, mareo, mala coordinación, pérdida de reflejos, convulsiones y efectos sobre el sistema nervioso central.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: Proporcionar tratamiento sintomático.

SPIROTETRAMAT + ABAMECTINA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA



**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 55 5598-6659, 55 5611-2634 Y
LADA SIN COSTO 800-009-2800.
O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS,
ATOX: 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010
Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](https://www.facebook.com/amvacmexico) [in amvac mexico](https://www.linkedin.com/company/amvac-mexico)