

**EXTRACTO VEGETAL DE
RHEUM OFFICINALE + PIRACLOSTROBINA**
FUNGICIDA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA



Fungicida Híbrido para el control de enfermedades fúngicas y bacterianas.

Okida SC Fungicida híbrido compuesto por dos ingredientes activos: un extracto vegetal de *Rheum officinale*, cuyos metabolitos confieren efecto fungicida y bactericida con acción multisitio, actuando principalmente sobre la integridad de las membranas celulares y activando la SAR (Resistencia sistémica adquirida), de la planta; y **Piraclostrobina**, fungicida del grupo de las estrobilurinas, de amplio espectro, con acción preventiva, curativa y translaminar. Su modo de acción consiste en bloquear la respiración mitocondrial del hongo, inhibiendo la síntesis de ATP, lo que impide la germinación, penetración y desarrollo del micelio, cuando se aplica en forma preventiva, contribuye a activar el sistema antioxidante de la planta, reduciendo la producción de etileno por estrés y retrasando la senescencia foliar.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Ingrediente activo: Extracto vegetal de <i>Rheum officinale</i> (Equivalente a 54.2 g de i.a./L a 20 °C)	5.00
Piraclostrobina: metil [2-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-iloximetil]fenil](metoxi)carbamato (Equivalente a 140.8 g de i.a./L a 20 °C)	13.00
Ingredientes Inertes: Surfactante, agente anticongelante, estabilizante, conservador, antiespumante, agente reológico y disolvente.	82.00
Total:	100.00

Registro No.: RSCO-MEZC-FUNG-0582-03010-X0189-064-18.0

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA/ENFERMEDAD	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Berenjena Chile Jitomate (Tomate rojo) Okra Papa Pimiento morrón Tomate verde (0)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.5 – 0.8	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros síntomas de las enfermedades; volumen de aplicación sugerido 400-500 L de agua/ha.
Calabaza Calabacita Chayote Melón Pepino Sandía (0)	Cenicilla (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Mildíu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0.5 – 1.2	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, durante el desarrollo vegetativo, al detectar los primeros síntomas de las enfermedades; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.

CULTIVO	PLAGA/ENFERMEDAD	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Fresa (0)	Cenicilla (<i>Sphaerotheca macularis</i>) Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.5 – 1.0	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 400-450 L de agua/ha.
Vid (5)	Cenicilla de la vid (<i>Uncinula necator</i>) Mildiú (<i>Plasmopara viticola</i>)	0.5 – 0.8	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros síntomas de las enfermedades; volumen de aplicación sugerido 400-500 L de agua/ha.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas entre la aplicación y la entrada del personal.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Antes de manipular, abrir, preparar y aplicar el producto, utilice siempre el equipo de protección personal completo indicado en la sección de “**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**” de esta etiqueta.

Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Para mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Calibre el equipo de aspersión para aplicar el volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme. Llene el tanque de mezclado con agua hasta 1/3 de su capacidad, agregue lentamente y con agitación la cantidad necesaria de **Okida SC** de acuerdo con la dosis del cuadro de recomendaciones, complete con agua hasta completar el volumen requerido y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No haga más aplicaciones consecutivas de las recomendadas. No exceda las dosis recomendadas en la etiqueta. No aplique con vientos superiores a los 4 m/s. No aplicar a temperaturas superiores de 28 °C. Se recomienda aplicar durante las primeras horas de la mañana.

FITOTOXICIDAD: El producto **Okida SC** no es fitotóxico a los cultivos y dosis aquí indicados si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA: No mezclar **Okida SC** con otros productos. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

**Fungicida Okida SC
FRAC MoA**

**Piraclostrobina: C3: Metoxy carbamatos
(13%, equivalente a 140,8 g de i.a./L a 20°C)**

Extracto vegetal de *Rehum officinale*: BM: Biológicos con multiples modos de acción: Extractos de plantas (5%, equivalente a 54.2 g de i.a./L a 20°C)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manipulación del producto durante la preparación de mezclas, la carga de equipos de aplicación, y la aplicación del producto: Camisa de manga larga de algodón, pantalón largo u overol de algodón, lentes de seguridad transparentes con protección hermética o careta facial protectora, guantes y botas de neopreno. Utilice mascarilla con filtro para vapores. Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. Mantenga su equipo de aplicación limpio, lavándolo con agua y jabón. La ropa y calzado utilizados deberán destinarse a este único fin y deberán ser almacenados en el lugar de trabajo y NO debe almacenarse o mezclarse con ropa de uso diario. Después de manejar el producto, báñese y cámbiese de ropa.

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.

Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

Si se ingiere: Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Okida SC contiene Piraclostrobina que pertenece al grupo químico de Estrobilurina.

Signos y síntomas de intoxicación: Los peligros para los seres humanos por la exposición a la Piraclostrobina incluyen lesiones oculares e irritación de la piel. **Si se ingiere:** Puede causar náusea, vómito, irritación del tracto digestivo, diarrea. **Si tiene contacto con la piel:** Puede ocasionar irritación, enrojecimiento, reacciones alérgicas. **Si se inhala:** Puede ocasionar tos, dolor de garganta, náusea, vómito. **Si hay contacto con los ojos:** Puede causar irritación, enrojecimiento, lagrimeo, ardor, comezón.

Antídoto y tratamiento específico: No existe un antídoto específico. Dé tratamiento sintomático. Tenga a la mano la etiqueta del producto.

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS (55) 5598-6659, (55) 5611-2634
Y LADA SIN COSTO 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN
INTOXICACIONES
POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:
AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.

An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010
Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)



www.amvac.com.mx

 [amvacmexico](https://www.facebook.com/amvacmexico)  [amvac mexico](https://www.linkedin.com/company/amvac-mexico)