

Ambush®25 P.H. Insecticida que actúa por contacto e ingestión sobre las larvas y adultos de lepidópteros y otros ordenes de insectos. Se caracteriza por su rapidez de acción, buena persistencia (de 1 a 3 semanas sobre hojas), y gran actividad a dosis baja. Posee buen efecto de choque y cierto efecto repelente (especialmente sobre adultos).

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Permetrina: 3-Fenoxibencil (1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (60% de isómero trans y 40% de isómeros cis) (Equivalente a 250 g de i.a./kg)	25.0
INGREDIENTES INERTES:	
Humectantes.	75.0
	Total 100.0

Registro: RSCO-INAC-0156-311-002-025

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGAS NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOSIS kg/ha	OBSERVACIONES
MAÍZ (1)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.25 – 0.75	Realizar 2 aplicaciones dirigidas al cogollo a intervalos de 7 días, cuando se detecten las primeras larvas.
JITOMATE (0) (Tomate)	Gusano Alfiler (<i>Keiferia lycopersicella</i>) Gusano del Fruto (<i>Helicoverpa zea</i>) (<i>H. virescens</i>) Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano del cuerno (<i>Manduca quinquemaculata</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp.</i>)	0.5 – 0.8	Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. No aplicar más de 1.24 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada. (5.76 kg de producto formulado).
MANZANO (0) DURAZNO (7) PERAL (14)	Palomilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>)	0.3 – 0.4	Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. No aplicar más de 1.792 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada. (6.4 kg de producto formulado).

CULTIVO	PLAGAS NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOSIS kg/ha	OBSERVACIONES
CHILE (3)	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano del Fruto (<i>Helicoverpa zea</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp.</i>)	0.5 – 0.8	Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. No aplicar más de 1.792 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada. (6.4 kg de producto formulado).
PAPA (7)	Palomilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>) Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	0.5 – 0.8	Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. No aplicar más de 1.792 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada. (6.4 kg de producto formulado).
AGUACATERO (14)	Trips (<i>Scirtothrips perseae</i>)	0.75 – 1.25	Aplice cuando aparezcan los primeros insectos. Realizar 2 aspersiones foliares (ponga especial atención en inflorescencias y áreas terminales) a intervalos de 7 días. No hacer más de 6 aplicaciones por temporada.

() Días entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a campos tratados: 12 horas.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Con el equipo de protección puesto, coloque la bolsa en forma vertical y ábrala con ayuda de unas tijeras o navaja. Agregue agua a la mitad de la capacidad del tanque aspersor manteniendo agitación constante. Agregue la dosis de **Ambush®25 P.H.** recomendada en esta etiqueta, llene el tanque con agua y continúe la agitación constante durante la aplicación.

APLICACIÓN: Utilice de 200 a 600 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre. En el cultivo de maíz, la aplicación se debe de realizar con equipo terrestre convencional, utilizando 400 litros de agua por hectárea. En el caso de aguacatero utilizar 1000 L/ha. Por ser un producto de contacto, es indispensable una buena cobertura foliar.

CONTRAINDICACIONES: Evite aplicar con vientos superiores a 8 km/h, en horas de calor y sol intenso (mayores de 40°C). No aplique cuando las abejas y otros polinizadores estén en el cultivo.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar AMBUSH® 25 P.H. en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

Insecticida Ambush 25 PH
IRAC MoA Grupo 3 Moduladores de los canales de sodio,
subgrupo 1A Piretroides
Acción nerviosa
Permetrina 25% equivalente a 250 g i.a.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, guantes resistentes a productos químicos, overol de algodón y botas de hule. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o con una solución alcalina. Evite inhalar los vapores o la aspersion durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que durante la aplicación el rocío caiga sobre la piel. Si observa algún malestar durante el trabajo deténgase y llame a un médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS” “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO” “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA” “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjugando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.

Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

Si se ingiere: Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

PERMETRINA / INSECTICIDA
POLVO HUMECTABLE

Ambush® 25 P.H.
INSECTICIDA

Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.

Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Ambush®25 P.H. contiene el ingrediente activo permetrina que pertenece al grupo químico de los piretroides.

Antídoto y tratamiento: No existe antídoto específico. En caso de intoxicación el tratamiento es sintomático.

Signos y síntomas de intoxicación: Puede provocar convulsiones, temblores, ansiedad, alergias, malestares gástricos, alteraciones de la conciencia y pérdida del conocimiento. Algunos otros síntomas de intoxicación son tos, irritación del tracto respiratorio, enrojecimiento de la piel, sensación de quemazón y picor, enrojecimiento y dolor en los ojos, dificultad respiratoria, episodios asmáticos. Así como cefaleas, anorexia, náuseas y vómitos.

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 55 5598-6659, 55 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 800-009-2800.
O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010
Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)

HECHO EN MÉXICO



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](https://www.facebook.com/amvacmexico) [in amvac mexico](https://www.linkedin.com/company/amvac-mexico)