

METALAXIL-M + CLOROTALONIL

SUSPENSIÓN CONCENTRADA



Fungicida que actúa en forma sistémica (metalaxil-M) penetrando en la planta, donde se trasloca por el sistema vascular hacia otros tejidos y de contacto (clorotalonil) el cual permanece sobre el follaje, impidiendo que las esporas germinen y penetren evitando nuevas infecciones.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Ingrediente activo:	
Metalaxil-M: Metil-N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-D-alaninato (Equivalente a 40 g de i.a./L a 20°C)	3.30
Clorotalonil: Tetracloroisofaltonitrilo (Equivalente a 400 g de i.a./L a 20°C)	33.00
Ingredientes Inertes:	
Dispersante, conservador, antiespumante, anticongelante, espesante, amortiguador y solvente.	63.70
Total:	100.00

Registro: RSCO-MEZC-1362-303-064-036

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOSIS kg/ha	OBSERVACIONES
Jitomate Papa (7)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.5 – 3.5	Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 10 días durante la época de floración a fructificación. Utilizando un volante de agua de 500 L/ha.
Cebolla Cebollín (7)	Mildiú (<i>Peronospora destructor</i>)	3.0 – 4.0	Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 10 días durante el desarrollo vegetativo utilizando un volumen de aplicación de 500 L/ha.
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía (7)	Mildiú (<i>Peronospora destructor</i>)	2.5 – 3.5	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, durante la época de floración y fructificación utilizando un volumen de agua de 500 L/ha.
Rosal (SL)	Mildiú (<i>Peronospora sparsa</i>)	3.0 – 3.5	Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días.
Brócoli Col Col de Bruselas (7)	Mildiú (<i>Peronospora parasítica</i>)	2.0 – 3.0	Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días utilizando un volumen de agua de 400 L/ha.

() Intervalo de Seguridad: Días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 48 Horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agregue la mitad de agua en su tanque de aspersión, abra el envase de **BLITZ**[®], girando la tapa hasta romper el arillo de plástico. Con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girando la tapa para romper totalmente el sello. Vacíe directamente la dosis del producto recomendada sin diluir, mantenga agitación constante, complete el resto de agua. Para obtener óptimos resultados, asegure una buena cobertura en la aplicación del producto, use 500 L de agua por ha.

CONTRAINDICACIONES:

No aplique **BLITZ**[®] con vientos superiores a 8 km/h. No aplique **BLITZ**[®] con calor excesivo. No aplique **BLITZ**[®] si el cultivo esta estresado por falta de fertilización, salinidad o exceso de humedad.

FITOTOXICIDAD:

No se presentan síntomas de fitotoxicidad aplicando **BLITZ**[®] en los cultivos a las dosis aquí recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD:

No se ha detectado incompatibilidad de **BLITZ**[®] en mezcla con otros agroquímicos, en caso de ser necesario realice mezclas, utilice solamente productos que cuenten con registro vigente autorizados en los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

FUNGICIDA BLITZ[®]

FRAC MoA: Actividad multisitio y ARN Polimerasa I,
FRAC Code: M05 (Clorotalonil) y Grupo 4 (Metalaxyl-M)
Grupo Químico o Biológico: Cloronitrilos y Fenil Amidas
Clorotalonil 33% + Metalaxyl - M 3.30%,
equivalente a 400 g+ 40 g i.a./Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (mascarilla contra polvos, lentes industriales, guantes, overol y botas de hule).

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO
Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA.**

METALAXIL-M + CLOROTALONIL

SUSPENSIÓN CONCENTRADA



PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto y colóquela en un lugar bien ventilado.

Consiga atención médica inmediata y muéstrela la etiqueta al médico.

Mantenga al paciente abrigado y en reposo.

Si ha habido salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia.

Si hubo derrame sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.

Si ha ingerido el producto, no provoque el vómito, consiga un médico inmediatamente y muéstrela esta etiqueta.

Si la persona esta inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Fenilamida + cloronitrilos.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: No se han registrado casos de intoxicación en humanos con este producto. En caso de inhalación o ingestión puede presentarse dolor de cabeza, diarrea o vómito. El producto es corrosivo y el daño en los ojos puede ser irreversible. Produce reacciones alérgicas a personas sensibles. Es irritante a la piel.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: En caso de intoxicación debiera proporcionarse tratamiento sintomático al paciente. No se conoce antídoto específico.

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 55 5598-6659, 55 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 800-009-2800.
O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010
Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)

HECHO EN MÉXICO



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](#) [in amvac mexico](#)