

**Bravo Gold®** es un fungicida compuesto de dos ingredientes activos que combina la acción sistémica del difenoconazole y la acción de contacto de clorotalonil, para el control de las enfermedades foliares de los cultivos del grupo de solanáceas y cucurbitáceas.

| COMPOSICIÓN PORCENTUAL:                                                                                                                                                        | % EN PESO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ingrediente activo:</b>                                                                                                                                                     |           |
| <b>Clorotalonil:</b> tetracloroisoftalonitrilo<br>(Equivalente a 500 g de i.a./L a 20°C)                                                                                       | 39.61     |
| <b>Difenoconazole:</b> 3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil-4-clorofenil éter.<br>(Equivalente a 50 g de i.a./L a 20°C) | 3.96      |
| <b>Ingredientes inertes:</b>                                                                                                                                                   |           |
| Dispersante, anticongelante, antiespumante, estabilizante, ajustador de pH, quelante, conservador y disolvente.                                                                | 56.43     |
| Total:                                                                                                                                                                         | 100.00    |

**Registro Sanitario No.: RSCO-MEZC-FUNG-0309-0375-X0089-064-43.57**

## INSTRUCCIONES DE USO

**CARACTERÍSTICAS:** **Bravo Gold®** es un fungicida con efecto sistémico y curativo (difenoconazol), y de contacto y preventivo (clorotalonil), para el control de las enfermedades que se mencionan en los cultivos enumerados en el cuadro.

| CULTIVO                                                                         | PLAGA                                                  | DOSIS (L/ha) | OBSERVACIONES                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berenjena (3)<br>Chile (0)<br>Jitomate (0)<br>Papa (0)<br>Tomate de cáscara (0) | <b>Tizón temprano</b><br>( <i>Alternaria solani</i> )  | 1.0 – 1.5    | Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 500 L/ha |
| Calabaza (0)<br>Calabacita (0)<br>Melón (0)<br>Pepino (0)<br>Sandía (0)         | <b>Mildiú</b><br>( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) | 1.0 – 2.5    |                                                                                             |

( ) **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 12 horas

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Durante el manejo, uso y aplicación del producto se debe de ocupar el equipo de protección personal indicado en la sección

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO de esta etiqueta. Para abrir el envase de **Bravo Gold®**, gire la tapa hasta romper el arillo de plástico, con la misma tapa de forma invertida, colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girando la tapa para romper totalmente el sello. Ponga la mitad de agua en su tanque de aspersión con la dosis del producto recomendada, mantenga agitación constante. Complete el resto con agua.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Para obtener óptimos resultados, asegure una buena cobertura en la aplicación del producto. Este producto debe aplicarse en cobertura total sobre el follaje, con equipo terrestre convencional con un volumen de agua de 500 L/ha.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplique **Bravo Gold®** en horas de calor intenso. No aplique **Bravo Gold®** con vientos superiores a 8 km/h. No aplique **Bravo Gold®** a través de riego por goteo.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico a los cultivos y dosis aquí indicados si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar **Bravo Gold®** con otros productos. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

**MANEJO DE LA RESISTENCIA:** PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

**Fungicida BRAVO® GOLD**  
**FRAC MoA**

**Difenoconazole: G1: triazoles**  
**(3.96%, equivalente a 50 g de i.a./L a 20°C)**

**Clorotalonil: M: cloronitrilos**  
**(39.61%, equivalente a 500 g de i.a./L a 20°C)**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, guantes resistentes a productos químicos, overol de algodón y botas de hule. La ropa de calzado utilizados deberá destinarse a este único fin y deberán ser almacenados en el lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o con una solución alcalina. Evite inhalar los vapores o la aspersión durante la aplicación o preparación de la

mezcla. No permita que durante la aplicación el rocío caiga sobre la piel. Si observa algún malestar durante el trabajo deténgase y llame a un médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

### PRIMEROS AUXILIOS

**Si hay contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.

**Si hay contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

**Si se ingiere:** Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

**Si se inhala:** Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento.

### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

**Bravo Gold®** contiene al ingrediente activo difenoconazole que pertenece al grupo químico G1: triazoles y al ingrediente activo clorotalonil que pertenece al grupo químico M: cloronitrilos.

**Signos y síntomas de intoxicación:** Si es ingerido puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, irritación estomacal y dolor abdominal. Puede causar irritación en los ojos y de moderada a severa irritación en la piel, si no se enjuaga inmediatamente con abundante agua. Puede producir reacciones alérgicas temporales caracterizadas por el enrojecimiento de los ojos, una ligera irritación bronquial y enrojecimiento o erupción en la piel expuesta. Si es inhalado puede provocar irritación del tracto respiratorio, tos, disnea, aumento de las secreciones bronquiales y rinitis.

Las personas que presentan reacciones alérgicas temporales responderán a un tratamiento con cremas antihistamínicas y/o esteroides sistémicos.

**Antídoto y tratamiento:** No existe un antídoto específico, dé tratamiento sintomático. Si el producto es ingerido, no provoque el vómito, haga lavado gástrico evitando la aspiración de contenidos gástricos. Administre tratamiento sintomático y de sostén.

**CLOROTALONIL+DIFENOCONAZOLE**  
FUNGICIDA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA



**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:  
**AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.**



Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja  
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010  
Tel: (33) 3110 1976  
800 00 AMVAC (26822)



[www.amvac.com.mx](http://www.amvac.com.mx)

[f amvacmexico](#) [in amvac mexico](#)