

Herbicida selectivo no sistémico pre y post emergente de acción rápida. Inhibe la protoporfirinógeno oxidasa y provoca la acumulación masiva de porfirinas que estimula la peroxidación de los lípidos de las membranas celulares produciendo daños irreversibles en la función y estructura de las membranas celulares de las plantas sensibles. En las plántulas en germinación produce necrosis de los brotes y la inhibición del crecimiento de las raíces. Es eficaz contra hierbas resistentes a las triazinas y a los inhibidores de la acetolactato sintasa.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Ingrediente activo:	
Flumioxazin: N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-eno-1,2-dicarboxamida (Equivalente a 510 g/kg)	51.00
Ingredientes Inertes: Dispersantes, humectante y diluyentes.	49.00
	Total: 100.0

Registro Sanitario No.: RSCO-HEDE-0202A-X0383-343-51.0

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS g/ha	OBSERVACIONES
Caña de azúcar (SL)	Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Flor amarilla (<i>Melampodium divaricatum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	100 – 300	Realizar una aplicación pre-emergente a la maleza y al cultivo, utilice un volumen de agua de 400 L/ha.
	Golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Coquilla (<i>Cyperus rotundus</i>)	200 – 300	
	Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>)	100 – 300	Realizar una aplicación pre-emergente a la maleza y post-emergente al cultivo; volumen de aplicación 400 L/ha.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite.

Tiempo de reentrada a campos tratados: No permita la entrada a las áreas tratadas hasta después transcurridas 12 horas de aplicado el producto.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Para preparar y aplicar el producto use el equipo de protección personal indicado en el apartado de **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO** en esta etiqueta. Gire la tapa en contrarreloj para abrir el envase. Llenar el tanque de aplicación hasta 3/4 partes de su capacidad con agua. Agregar el producto a la dosis recomendada y complete la capacidad sin dejar de agitar.

Gesapax® PreMax es un herbicida pre-emergente que requiere humedad suficiente para que el producto se active; es recomendable el riego preferentemente posterior a la aplicación o hacer la aplicación en suelos con suficiente humedad. La aplicación de este producto en suelos con alto contenido de materia orgánica o suelos de textura pesada requerirán el empleo de la dosis más alta de acuerdo a la recomendación de la etiqueta.

CONTRAINDICACIONES: No se recomienda el empleo de **Gesapax® PreMax** bajo condiciones de frío excesivo o fuerte inversión térmica.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico para los cultivos aquí indicados a las dosis aquí recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD: Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

Herbicida Gesapax® PreMax
MoA HRAC group E, WSSA 14.
Inhibidores de la protoporfirinógeno oxidasa
Flumioxazin 51.0% equivalente a 510 g i.a./kg.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Al manejar o manipular este producto utilice equipo de protección personal adecuado, que incluya mascarilla con filtros, overol de algodón de manga larga y gorra o sombrero, lentes de seguridad, botas y guantes de hule. Evite el contacto con la piel, boca, ojos, ropa y la inhalación del producto. No aplique contra el viento, ni cuando este favorezca el acarreo del material. Después de la jornada laboral deberá lavar con abundante agua y jabón la ropa y equipo de protección de manera separada a la ropa de uso común, y guardarlos en el sitio de trabajo bajo llave.

PRIMEROS AUXILIOS: Si el material ha sido inhalado retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar fresco y ventilado, abrigándola bien; si la persona se

encuentra inconsciente administre respiración artificial por personal capacitado. Busque atención médica inmediata. Si ha ocurrido contacto con los **ojos**, lávese con agua corriente durante 15 minutos. Si ha ocurrido contacto sobre la **piel**, lávese cuidadosamente con agua y jabón. En el caso de que el material haya sido **ingerido**, provocar el vómito **NO ES RECOMENDABLE** como primera medida de ayuda, retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Grupo químico: Dicarboxamida. **Síntomas de intoxicación:** En caso de inhalación se puede presentar respiración irregular y flujo nasal. En caso de contacto con la piel o los ojos se puede presentar irritación y/o enrojecimiento en la zona de contacto. En caso de ingestión, se puede presentar irritación en garganta, escalofríos o piloerección temporal. **Tratamiento:** No existe un antídoto específico, se deberá administrar tratamiento sintomático, incluyendo cuando sea necesario, medidas de apoyo general como respiración artificial. Cuando hay ingestión oral se recomienda el lavado gástrico.

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE AL CENTRO DE
TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS,
ATOX: 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:
AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.



Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010
Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](#) [in amvac mexico](#)