

Nematicida concentrado de amplio espectro de especies de nematodos.

Nemacur® 400 CE Nematicida e insecticida sistémico de amplio espectro, con actividad por contacto e ingestión. Se distingue por su elevada actividad sobre nemátodos ectoparásitos y endoparásitos de las raíces y de la parte aérea. Actúa interfiriendo la transmisión de los impulsos nerviosos por inhibición de la colinesterasa. Por su acción sistémica controla nematodos y plagas insectiles del suelo y la parte aérea de la planta.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Ingrediente activo:	
Fenamifos (Equivalente a 400 g i.a./L a 20°C)	38.80%
Ingredientes Inertes:	
Solvente, emulsificante y compuestos relacionados	61.20%
	Total: 100.0%

Registro No.: RSCO-NEMA-0902-002-009-039

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
ALGODONERO	Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne</i> sp.) Nemátodo lesionador (<i>Pratylenchus</i> sp.) Nemátodo de la raíz (<i>Aphelenchus</i> sp.) (<i>Tylenchus</i> sp.)	3.75 a 5	
Ajo	Nemátodo lesionador (<i>Ditylenchus</i> sp.) Nemátodo de la raíz (<i>Pratylenchus</i> sp.) Nemátodo de los bulbos (<i>Aphelenchus</i> sp.) (<i>Tylenchus</i> sp.)	6 a 8	
Cacahuete	Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne</i> sp.) Nemátodo de la raíz (<i>Tylenchus</i> sp.)	4 a 7.5	Aplique a la siembra o plantación en banda de 30 a 40 cm.
Okra	Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne</i> sp.) Nemátodo de la raíz (<i>Tylenchus</i> sp.)	3 a 4	Emplee agua necesaria para una buena distribución e incorporación del producto.
Papa	Nemátodo de los bulbos (<i>Ditylenchus</i> sp.) Nemátodo dorado (<i>Globodera</i>) Nemátodo agallador (<i>Rostochiensis</i>) Nemátodo de la raíz (<i>Meloidogyne</i> sp.) Nemátodo lesionador (<i>Aphelenchus</i> sp.) Nemátodo de la raíz (<i>Pratylenchus</i> sp.) (<i>Tylenchus</i> sp.)	10 a 15	Use las dosis más elevadas en plantaciones con historial de nemátodos.
Soya	Nemátodo del raquitismo (<i>Tylenchorrynchus</i> sp.) Nemátodo lesionador (<i>Pratylenchus</i> sp.) Nemátodo espiral (<i>Helicotylenchus</i> sp.)	3 a 5	
Tabaco	Nemátodo de la raíz (<i>Aphelenchus</i> sp.) Nemátodo lesionador (<i>Pratylenchus</i> sp.) Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne</i> sp.) Nemátodo de la raíz (<i>Tylenchus</i> sp.)	5 a 10 5 a 6 mL/m ²	Al trasplante En plantero

FENAMIFOS / NEMATICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE



CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Cacao	Nemátodo lesionado (<i>Pratylenchus</i> sp.) Nemátodo de la raíz (<i>Aphelenchus</i> sp.) (<i>Tylenchus</i> sp.)	5 a 6 mL/m ² (en viveros) 150 a 200 mL/ 10L de agua	Trate el suelo antes de lo siembra. riegue después En plantaciones establecidas aplique asperjando el suelo en el área de goteo, usando 1L/arbusto
Limonero, lima, naranja, tangerino y toronjo	Nemátodo de la raíz (<i>Aphelenchus</i> sp.) Nemátodo de los bulbos (<i>Aphelenchoides</i> sp.) (<i>Tylenchus</i> sp.) Nemátodo agallador (<i>Ditylenchus</i> sp.) Nemátodo lesionado (<i>Helicotylenchus</i> sp.) (<i>Pratylenchus</i> sp.)	20mL/ L de agua	Asperje 200 ml alrededor de la planta ya trasplantada en el lugar definitivo. Repita a los 3 o 4 meses. No aplicar 180 días antes de la cosecha.
Durazno y manzano	Nemátodo de la raíz (<i>Aphelenchus</i> sp.) Nemátodo de los bulbos (<i>Ditylenchus</i> sp.) Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne</i> sp.) Nemátodo lesionado (<i>Pratylenchus</i> sp.)	150 mL/ 10 L de agua	Aplice en cajete o área de goteo, usando 1 L de mezcla por árbol. Última aplicación 45 a 72 días antes de la cosecha
Piña	Nemátodo anillo (<i>Criconeoides</i> sp.) Nemátodo espiral (<i>Helicotylenchus</i> sp.) Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne</i> sp.) Nemátodo lesionado (<i>Pratylenchus</i> sp.) Nemátodos (<i>Criconema</i> sp.), (<i>Rotylenchus</i> sp.), (<i>Tylenchus</i> sp.), (<i>Xiphinema</i> sp.)	25 10	Antes de la siembra En plantaciones establecidas aplicación al suelo a los 90 150 días.
Plátano	Nemátodo de la raíz (<i>Aphelenchus</i> sp.) Nemátodo espiral (<i>Helicotylenchus</i> sp.) Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne</i> sp.) Nemátodo lesionado (<i>Pratylenchus</i> sp.) Nemátodo barrenador (<i>Radopholus similis</i>) Nemátodo del raquitismo (<i>Tylenchorhynchus</i> sp.)	40 a 60 mL/ 10 L de agua 80 mL/ 10 L de agua	Aplice en aspersión al suelo. 1L/cepa al momento de la aplicación. Asperje en la base de los hijuelos en media luna, previa limpieza de hojarasca. 1 L de mezcla/hijuelo y repitiendo cada 4 a 6 meses.
Vid	Nemátodo lesionado (<i>Pratylenchus</i> sp.) Nemátodos (<i>Criconema</i> sp.), (<i>Rotylenchus</i> sp.), (<i>Dikrella</i> sp.), (<i>Heterodera</i> sp.), (<i>Xiphinema</i> sp.), (<i>Erythroneura</i> sp.), (<i>Frankiniella</i> sp.)	10 a 15 1.0 a 1.5	Aplice durante la brotación en banda a ambos lados, o bien a través del sistema de riego por goteo al suelo. Después de la aplicación regar abundantemente.
Ornamentales	Nemátodo de la raíz (<i>Aphelenchus</i> sp.) Nemátodo anillo (<i>Aphelenchus</i> sp.) Nemátodo espiral (<i>Criconeoides</i> sp.) Nemátodo agallador (<i>Helicotylenchus</i> sp.) (<i>Meloidogyne</i> sp.) Nemátodo lesionado (<i>Pratylenchus</i> sp.)	2.5 a 4mL/ m ² del suelo	Mezcle con agua y asperje uniformemente el área, posteriormente aplicar un riego. No aplique más 2 veces por año.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 48 horas

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Calibrar el equipo de aplicación. En un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad de agua, agregar la dosis necesaria del producto y agitar. Posteriormente vaciar esta premezcla al tanque del equipo de aplicación y agregar la totalidad de agua calculada en la calibración. *Las variaciones en las dosis dependen del grado de infestación.

CONTRAINDICACIONES:

No Aplicar **NEMACUR® 400 CE** sin el equipo de protección personal necesario. En ornamentales no aplicar más de 2 veces al año.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **NEMACUR[®] 400 CE** con otros productos. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o neblinas, lentes de seguridad o careta, guantes resistentes a productos químicos, overol de algodón y botas de hule. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o con una solución alcalina. Evite inhalar los vapores o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que durante la aplicación el rocío caiga sobre la piel. Si observa algún malestar durante el trabajo deténgase y llame a un médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado mientras no se utilice. Almacénesse en un lugar seguro bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para tratamiento.

Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15 – 20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

Si se ingiere: Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si esta en posibilidad de deglutir. No induzca al vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No de nada por la boca a una persona inconsciente.

Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).

FENAMIFOS / NEMATICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE

Nemacur® 400_{CE}
NEMATICIDA

Distribuidor:
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010
Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)

HECHO EN MÉXICO



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](https://www.facebook.com/amvacmexico) [in amvac mexico](https://www.linkedin.com/company/amvac-mexico)