

Reflect®125 EC es un Fungicida de amplio espectro perteneciente al grupo de las carboxamidas, también conocidas como SDHI, cuyo ingrediente activo es isopyrazam.

Actúa inhibiendo el complejo II de la respiración de los hongos susceptibles, al actuar sobre la enzima succinato deshidrogenada. El sitio principal de acción es en el desarrollo del tubo germinativo y la formación de haustorios, lo que explica su actividad principalmente preventiva. Sin embargo, isopyrazam también inhibe el crecimiento de hongos después de la penetración del hongo en la hoja.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Isopyrazam: Mezcla de 2 isómeros 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-carboxamida y 2 isómeros 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-carboxamida (Equivalente a 125 g de i.a./L a 20 °C)	Total: 13.10

Registro No.: RSCO-FUNG-0398-X0140-009-13.1

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Banano Plátano (0)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.6 a 0.7*	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, según la presión de la enfermedad y las condiciones climáticas prevaletentes.
Berenjena (0) Chile (0) Jitomate (0) Pimiento morrón (0) Tomate verde (0)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.4 – 0.5	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y la severidad aproximada de 3 a 5%. Volumen de aplicación sugerido: 350 – 450 L de agua/ha.
Calabacita (1) Pepino (1) Calabaza (7) Sandía (7) Melón (6)	Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) Tizón foliar (<i>Alternaria cucumerina</i>)	0.75 – 1.25	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y la severidad sea menor o igual a 3%. Volumen de aplicación sugerido: 350 – 450 L de agua/ha.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

* **Adicionar aceite agrícola a dosis de 1.0 L de p.f./100 L de agua. Usar un adherente tipo emulsificantes (no iónico) a razón de 1 c.c./L de agua.**

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:

Esperar mínimo 4 horas antes de entrar al área tratada.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Durante el manejo, preparación y aplicación del producto, utilizar el equipo de protección personal, tomando en cuenta las recomendaciones en el apartado **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO** de la presente etiqueta.

En emulsión de aceite en agua: Colocar en el tanque de mezcla el aceite agrícola, adicionar emulsificante y después agregar el fungicida y completar con agua hasta alcanzar un volumen final de 18 a 28 litros por hectárea.

Orden de mezcla

1. Colocar el aceite + emulsificante (agitar bien durante 5 a 10 minutos).
2. Agregar la dosis de **Reflect®125 EC** (AGITAR BIEN DURANTE 5 A 10 MINUTOS).
3. Completar con agua hasta alcanzar el volumen final requerido (Agitar bien durante 5 a 10 minutos).

En aceite puro: Colocar en el tanque de mezcla el aceite agrícola y agregar **Reflect®125 EC** hasta alcanzar un volumen final de 10-15 L/ha.

Orden de mezcla

1. Colocar el 100% del volumen de aceite.
2. Agregar la dosis de **Reflect®125 EC** (Agitar bien durante 5 a 10 minutos).

EQUIPO DE APLICACIÓN: **Reflect®125 EC** puede aplicarse con aspersora terrestre de mochila o de tractor. El equipo que se use deberá calibrarse. Lavar el equipo con detergente o amoníaco para evitar daños en aplicaciones posteriores.

CONTRAINDICACIONES: No haga más aplicaciones consecutivas de las recomendadas. No exceda las dosis recomendadas en la etiqueta. No aplique con vientos superiores a los 4 m/s. No aplicar a temperaturas superiores de 28 °C. No aplique cuando el cultivo esté estresado por condiciones de sequía o mucha humedad. Se recomienda aplicar durante las primeras horas de la mañana.

FITOTOXICIDAD: Cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones de uso, **Reflect®125 EC** es fitocompatible con los cultivos hacia los cuales va dirigido.

INCOMPATIBILIDAD: A excepción de mezclas con aceite agrícola, no se recomienda **Reflect®125 EC** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente la etiqueta. Durante el manejo, preparación y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado y completo: mascarilla contra polvos y neblinas, lentes industriales o careta, guantes de nitrilo, overol y botas de hule. Después de la jornada de trabajo

báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. La ropa utilizada deberá lavarse aparte y guardarse separada del resto de la ropa. Lave el equipo de aplicación y el equipo de protección y resguárdelos en el lugar de trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de emergencia, tenga a la mano la hoja de seguridad o la etiqueta del producto.

- **Si se ingiere:** Busque atención médica inmediatamente y muéstrela este panfleto. No induzca el vómito. Nunca dé algo por la boca a una persona inconsciente.
- Retire a la persona del área contaminada, llévela a un lugar fresco y ventilado y manténgala en reposo. Si es necesario, administre respiración artificial. Llame a un médico inmediatamente.
- **En caso de contacto con los ojos:** Aplique un lavado ocular de 15 – 20 minutos, incluso debajo de los párpados. Remueva lentes de contacto en caso de que el paciente los porte después de 5 minutos y posteriormente continúe con el lavado ocular. Obtener atención oftalmológica inmediata.
- **En caso de inhalación:** Mueva a la víctima del área contaminada a un área ventilada. Aplique respiración artificial de ser necesaria.
- Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lave con abundante agua y jabón las partes del cuerpo afectadas. Si la irritación persiste, llame inmediatamente a un médico. Lave siempre la ropa contaminada antes de usarla nuevamente.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS (55) 5598-6659, (55) 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:

AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010

Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)

HECHO EN MÉXICO



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](#) [in amvac mexico](#)