

FORATO / INSECTICIDA-ACARICIDA
GRANULADO



Insecticida - acaricida sistémico acrópetalo controla plagas del follaje y suelo.

THIMET® 15G es un insecticida – acaricida de amplio espectro, que actúa por ingestión contra insectos chupadores, larvas de lepidópteros, larvas de coleópteros, trips y ácaros de diversas especies que atacan cultivos de importancia económica. **THIMET® 15G** presenta sistemía acropétala, lo que asegura la protección de las estructuras aéreas aún cuando se aplica al suelo; y por su prolongada residualidad incrementa el periodo de protección.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Ingrediente activo: FORATO O, O-dietil-S-[(etiltio)-metil fosforoditioato. (Equivalente a 150 g de i.a./kg)	15.0%
Ingredientes Inertes: Diluyente granulado, deactivador, acondicionador de fluidez y compuestos relacionados:	85.0%
	Total: 100.0%

Registro No.: RSCO-INAC-0136-306-005-015

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Kg/ha	RECOMENDACIONES
PAPA (90)	Áfidos (<i>Myzus persicae</i>), (<i>Macrosiphum euphorbie</i>) Chicharritas (<i>Empoasca</i> spp.) Mosca blanca (<i>Bemisia</i> sp.)	13 a 17	Aplicación en banda a la siembra
ALGODONERO (60 a 90)	Trips (<i>Frankliniella</i> spp.) Áfidos (<i>Aphis</i> spp.)	7 a 10	Aplicación a la siembra o incorporando a los lados de la planta.
	Ácaros (<i>Tetranychus</i> spp.)	13 a 15	Algodón de riego, aplicación a la siembra o incorporando a los lados.
FRIJOL (60)	Chicharritas (<i>Empoasca</i> spp.) Pulgones (<i>Aphis</i> spp.) Araña roja (<i>Tetranychus</i> spp.)	7 a 10	Aplicación en surcos al sembrar. los gránulos no deben estar en contacto con la semilla. No alimentar al ganado con el forraje tratado.
JITOMATE (28)	Minadores (<i>Liriomyza munda</i>)	10	Aplicar en banda a los lados del surco en el trasplante. los gránulos no deben quedar en contacto con la semilla o plántula.
CEBADA DE RIEGO (60)	Pulgones (<i>Schizaphis graminum</i>)	8	Aplicar los gránulos en surco a la siembra. Irrigar después del tratamiento de Cebada (de riego).

FORATO / INSECTICIDA-ACARICIDA
GRANULADO



CULTIVO	PLAGA	DOSIS Kg/ha	RECOMENDACIONES
MAÍZ (30)	Ácaros (<i>Tetranychus</i> spp.) Gusano alambre (<i>Melanotus</i> spp.) Diabrotica (<i>Diabrotica</i> spp.) Pulgones (<i>Rhopalosiphum</i> spp.)	8	Aplicar en bandas a la siembra sobre el surco. Los gránulos no deben quedar en contacto con la semilla. Pueden hacerse 2 aplicaciones.
	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	2.0 a 4.0	Realizar una aplicación al follaje, dirigida al cogollo de la planta.
	Gallina ciega (<i>Phyllophaga ravidia</i>)	5.0 a 7.5	Aplicar al fondo del surco al mometo de la siembra.
CACAHUATE (30)	Trips (<i>Caliothrips</i> spp.)	8	Distribuir los gránulos sobre el surco al sembrar. aplicación a la siembra
	Chicharritas (<i>Empoasca</i> spp.) Pulgones (<i>Rhopalosiphum</i> spp.)	13	Distribuir los gránulos en banda sobre la zona de fructificación e incorporar, los gránulos no deben estar en contacto con la semilla
SOYA (45)	Conchuela del frijol (<i>Epilachna varivestis</i>) Chicharritas (<i>Empoasca</i> spp.) Trips (<i>Caliothrips</i> spp.)	13	Aplicar a la siembra en banda de 5 cm a los lados de la semilla y a 5 cm de profundidad. Los gránulos no deben estar en contacto con la semilla.
CAÑA DE AZÚCAR (45)	Mosca pinta (<i>Aeneolamia postica</i>) Pulgón amarillo (<i>Sipha flava</i>)	10 a 15	Aplicar en bandas después del escarde.
	Gusano barrenador de caña de azúcar (<i>Diatraea saccharalis</i>)	7.5 a 15	Realizar una aplicacion al volteo cuando se detecten los primeros individuos de la plaga.
TRIGO (45)	Pulgones (<i>Rhopalosiphum</i> spp.) Araña café (<i>Petrobia latens</i>)	8	Aplicar los gránulos sobre el surco a la siembra. No hacer aplicación posterior
SORGO (30)	Pulgón amarillo del sorgo (<i>Melanaphis sacchari</i>)	8 a 10	Realizar una aplicación al fondo del surco al momento de a siembra
AGAVE (*)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp.)	7.5 a 15	Realizar una aplicación del producto cerca del temporal de lluvias con el cultivo ya establecido. La aplicación debe ser realizada de forma manual (obligatorio equipo de protección: guantes de nitrilo, lentes y mascarilla) y en banda al fondo del surco, siguiendo las instrucciones siguientes: 1. Abrir dos pequeños surcos de al menos 5 cm de profundidad a cada lado de la línea de plantas de agave. 2. Depositar el producto al fondo de los surcos, formando una banda de aplicación de al menos 15 cm de ancho para lograr una mejor protección de la zona de crecimiento radicular. 3. Posterior a la aplicación, cubrirlo con suelo.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

(*) No aplicar en plantaciones mayores a 5 años.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas para cultivos abiertos y 8 días para cultivos cerrados.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Con el equipo de protección puesto, coloque la bolsa en forma vertical y ábrala con ayuda de unas tijeras o navaja, agregue el producto al equipo de aplicación. El equipo recomendado para la aplicación de **THIMET® 15G** es un aplicador tipo Gandy. Llene los depósitos de su equipo de aplicación, con la ropa de protección recomendada. Vierta los gránulos en la misma dirección del viento y nunca haga la operación al nivel de la cara.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna adicional a las mencionadas anteriormente

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: **THIMET® 15G** no es compatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, y a materiales alcalinos.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MACANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

Insecticida THIMET® 15 G
IRAC MoA Grupo 1 Inhibidores
de la colinesterasa,
subgrupo 1B Organofosforados
Acción nerviosa
Forato 15% equivalente a 150 g i.a.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o vapores, lentes industriales, guantes, overol y botas de hule. Evite inhalar el producto durante la aplicación. No permita que el producto caiga sobre la piel durante la aplicación. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Al final de la jornada báñese y póngase ropa limpia. Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame al médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado, mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de envenenamiento o a un médico para el tratamiento.

Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

Si se ingiere: Llame al centro de control de envenenamiento o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de envenenamientos o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al doctor para el tratamiento.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

El ingrediente activo de **THIMET® 15G** es forato que pertenece al grupo químico de los organofosforados, actúa en el sistema nervioso.

Signos y síntomas de intoxicación: **Por ingestión** puede provocar dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, pupilas contraídas, calambres, abdominales, sudoración excesiva y salivación. **Por inhalación:** Lagrimeo, opresión torácica, debilidad, espasmos musculares y confusión.

Por contacto con la piel: Irritación, sudoración. Puede provocar irritación ligera pero temporal por contacto con los ojos.

Tratamiento: Aplicar de 1.0 a 2.0 mg. (adulto) y 0.02 y 0.05 mg. (menores de 12 años) /kg de peso corporal de sulfato de atropina por vía intravenosa, cada 10 minutos, hasta atropinización completa. Si el paciente no responde satisfactoriamente al Sulfato de atropina, aplíquese reactivadores de la colinesterasa, aplique lentamente TOXOGONIN 250 mg. Vía intravenosa (1 ampollita) para adultos 1- 2 veces con intervalo de 2 horas y en niños menores de 12 años 4-5 mg. /kg. de peso corporal. Limpiar vías respiratorias, aplicar oxígeno si es necesario, determinar y observar niveles de colinesterasa en sangre. Observe al paciente por lo menos durante 24 horas. Están contraindicados la morfina, fenotiazinas, succinilcolina, epinefrina y los barbitúricos. ¡No administre atropina a una persona cianótica!

FORATO / INSECTICIDA-ACARICIDA
GRANULADO

Thimet® 15g
INSECTICIDA

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL CENTRO DE
TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010
Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](#) [in amvac mexico](#)

AUT-B0205.