



Assure[®] II

**QUIZALOFOP/ HERBICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE**

Es un Herbicida sistémico post-emergente, formulado como concentrado emulsionable.

ASSURE[®] II es un herbicida que afecta principalmente los meristemos y tejidos jóvenes de la maleza.

INGREDIENTE ACTIVO:	% p/p
Quizalofop (Equivalente a 100 g de i.a./L a 20°C)	10.50%
INGREDIENTES INERTES: Emulsificantes, solventes	89.50%
TOTAL	100 %

Registro No.: RSCO-HEDE-0262-X0115-009-10.50

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	Malezas	DOSIS ml/ha	OBSERVACIONES
Papa (SL)	Horquetilla (<i>Paspalum conjugatum</i>) Zacate pata de ganso (<i>Eleusine multiflora</i>)	400 - 500	Realizar aplicación total en post-emergencia a la maleza y al cultivo, cuando la maleza tenga de 15 a 20 cm de altura.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas

() **Intervalo de Seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL = Sin Límite.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto, agite el producto y abra cuidadosamente el envase embonando la parte superior de la tapa con la abertura del mismo. Gire presionando ligeramente hasta que el sello se rompa por completo al nivel del contorno de la boca del envase. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Coloque agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de aspersión e iniciar la agitación, vierta la cantidad recomendada de **ASSURE® II** y complete la capacidad del tanque con el agua necesaria. Mantener la agitación durante la mezcla y aplicación del producto al cultivo. El volumen de agua utilizado es de 300 mL/ha.

CONTRAINDICACIONES

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/h), o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA CON OTROS PRODUCTOS O SUSTANCIAS.

No mezclar **ASSURE® II** con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si hay contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos y lávelos con agua limpia 15-20 minutos

En caso de contacto con la piel o ropa: Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón.

En caso de ingestión: Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal.

En caso de inhalación: Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar, acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y de respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SIN TOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:

AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.



Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010

Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)

HECHO EN MÉXICO



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](https://www.facebook.com/amvacmexico) [in amvac mexico](https://www.linkedin.com/company/amvac-mexico)