



**TEBUPIRIMFOS /INSECTICIDA  
GRANULADO**

Insecticida organofosforado en presentación granulada para aplicar al suelo en el momento de la siembra. Actúa sobre la plaga en su hábitat natural: en el suelo, donde la planta desarrolla su sistema radical.

Muy eficaz contra larvas de coleópteros y lepidópteros que viven en el suelo entre los que destacan diabroticas o doradillas, gallinas ciegas, etc.

**COMPOSICIÓN PORCENTUAL:**

<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	<b>% EN PESO</b>
Tebupirimfos: O-[2-(1,1-dimetiletil)-5-pirimidinil]O-etilo y O-(1-metiletil) fosforotioato (Equivalente a 20 g de i.a./kg)	2.0
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	
Diluyente granulado, adherente, colorante y compuestos relacionados.	98.0
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>

**REG.: RSCO-INAC-0102C-301-005-002**



## INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGAS NOMBRE COMÚN/ CIENTÍFICO	DOSIS kg/ha	DOSIS APLICACIONES
AGAVE	<b>Gallina ciega</b> <i>Cyclocephala lunata</i> <i>Phyllophaga crinita</i>	10 - 12	Aplique en el suelo, al lado de la planta e incorpore el producto. También se pueden usar los aplicadores Gandy adaptadas al tractor. <b>No aplicar en plantaciones mayores a 4 años.</b>
PAPA	<b>Gallina ciega</b> <i>Phyllophaga obsoleta</i>	12 - 14	Aplique al fondo del surco al momento de la siembra. Puede aplicarse junto con la semilla y el fertilizante

Tiempo de reentrada a campos tratados: 12 horas

La variación de las dosis depende del grado de infestación de las plagas.

**MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** Con el equipo de protección personal puesto, coloque el saco en posición vertical y abra con la ayuda de una navaja o tijeras. Debido a que **AZTECA**<sup>®</sup> es un producto granulado, está listo para usarse. Calibre su equipo de aplicación para lograr una distribución homogénea del producto.

**INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA:** **AZTECA**<sup>®</sup> es compatible con otros fungicidas e insecticidas, excepto con aquellos de reacción alcalina. Cuando sea necesario hacer mezclas, estas solo deberán hacerse con productos con registro vigente y que estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Aplique con una bomba de espalda para granulados, en equipos para aplicación de granulados acoplados al tractor tipo "Gandy", dentro de la tolva de insecticidas de los equipos JohnDeere MAX-EMERGE, International Harvester e incluso en mezcla con fertilizantes compatibles granulados secos en otros equipos para aplicación en banda o incorporado. Evite siempre moler el producto para evitar la formación de polvo y taponamientos. Verifique la dirección correcta de rotación del dosificador.

**CONTRAINDICACIONES:** Agave; No aplicar en plantaciones mayores a 4 años.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar **AZTECA**<sup>®</sup> con otros productos. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

### MANEJO DE LA RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

**Insecticida AZTECA<sup>®</sup>**  
**IRAC MoA Grupo 1 Inhibidores de la colinesterasa,**  
**Subgrupo 1B Organofosforados**  
**Acción nerviosa**  
**Tebupirimfos 2.0% equivalente a 20 g i.a./kg.**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o vapores, lentes industriales, guantes, overol y botas de hule. Evite inhalar el polvo durante la aplicación. No permita que el producto caiga sobre la piel durante la aplicación. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame al médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado, mientras no se utilice. Almacénesse en un lugar seguro, bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

### PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con los ojos: En caso de contacto, mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de envenenamiento o a un médico para el tratamiento.

Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

Si se ingiere: Llame al centro de control de envenenamiento o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de envenenamientos o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al doctor para el tratamiento.

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO:** AZTECA<sup>®</sup> contiene al ingrediente activo tebupirimfos que pertenece al grupo químico de los organofosforados y que actúa en el sistema nervioso.

**Antídotos y tratamiento específico:** Aplicar de 1.0 a 2.0 mg. (adulto) y 0.02 y 0.05 mg. (menores de 12 años) /kg de peso corporal de sulfato de Atropina por vía intravenosa, cada 10 minutos, hasta atropinización completa. Si el paciente no responde satisfactoriamente al Sulfato de Atropina, aplíquese reactivadores de la colinesterasa, aplique lentamente TOXOGONIN (Cloruro de obidoxima) 250 mg. vía intravenosa (1 ampollita) para adultos 1-2 veces con intervalo de 2 horas y en niños menores de 12 años 4-5 mg. /kg. de peso corporal. 2-PAM, el cloruro de protopam o similares. Si se usa vía intravenosa una sola dosis de 1 g. en adultos o de 0.25 g. en niños. Si se dispone de cloruro de protopam, inyéctese lentamente por vía intravenosa una dosis inicial de 500 mg. en casos medianamente graves o de 1 g. casos graves, aplicar a los 30 minutos otra dosis de 500 mg. Repetir si es necesario a los 30 minutos otra dosis de 500 mg. En cada caso, limpiar vías respiratorias, aplicar oxígeno si es necesario, determinar y observar niveles de colinesterasa en sangre. Observe al paciente por lo menos durante 24 horas. Están contraindicados la morfina, fenotiazinas, succinicolina, epinefrina y los barbitúricos. ¡No administre atropina a una persona cianótica! Signos y síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza, debilidad, mareos, náusea, vómito y diarrea; ansiedad, ambliopía, calambre y opresión torácica. Los signos comprenden: sudoración, miosis, lagrimeo, salivación y otras secreciones excesivas del aparato respiratorio. En caso de intoxicación severa se puede manifestar cianosis, sacudidas musculares incontrolables, convulsiones, pérdida de control de esfínteres, en casos graves: coma y paro respiratorio.

**Signos y síntomas de intoxicación:** Efectos muscarínicos: Puede provocar convulsiones, temblores, ansiedad, alergias, malestares gástricos, alteraciones de la conciencia y pérdida del conocimiento. Algunos otros síntomas de intoxicación son tos, irritación del tracto respiratorio, enrojecimiento de la piel, sensación de quemazón y picor, enrojecimiento y dolor en los ojos, dificultad respiratoria, episodios asmáticos. Así como cefaleas, anorexia, náuseas y vómitos.

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SIN TOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:

**AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.**



An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja

Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010

Tel: (33) 3110 1976

800 00 AMVAC (26822)

**HECHO EN MÉXICO**



[www.amvac.com.mx](http://www.amvac.com.mx)

[f amvacmexico](https://www.facebook.com/amvacmexico) [in amvac mexico](https://www.linkedin.com/company/amvac-mexico)

