



Nemacur[®] 400_{CE}
NEMATICIDA

FENAMIFOS/ NEMATICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE

Nematicida concentrado de acción sistémica de amplio rango de control de especies de nematodos.

Por su acción sistémica controla nematodos y plagas insectiles del suelo.

INGREDIENTE ACTIVO:	% p/p
Fenamifos (Equivalente a 400 g de i.a./L a 20°C)	38.80%
INGREDIENTES INERTES: Solvente, emulsificante y compuestos relacionados	61.20%
TOTAL	100 %

Registro No.: RSCO-NEMA-0902-002-009-039

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	OBSERVACIONES	
	Nombre común	Nombre científico			
Algodonero	Nemátodo agallador Nemátodo lesionado Nemátodo de la raíz	<i>Meloidogyne sp</i> <i>Pratylenchus sp</i> <i>Aphelenchus sp</i> <i>Tylenchus sp</i>	3.75 a 5	<p>Aplice a la siembra o plantación en banda de 30 a 40 cm.</p> <p>Emplee agua necesaria para una buena distribución e incorporación del producto. Use las dosis más elevadas en plantaciones con historial de nemátodos.</p> <p>Al trasplante</p> <p>En plantero</p>	
Ajo	Nemátodo lesionado Nemátodo de la raíz Nemátodo de los bulbos	<i>Ditylenchus sp</i> <i>Pratylenchus sp</i> <i>Aphelenchus sp</i> <i>Tylenchus sp</i>	6 a 8		
Cacahuete	Nemátodo agallador Nemátodo de la raíz	<i>Meloidogyne sp</i> <i>Tylenchus sp</i>	4 a 7.5		
Okra	Nemátodo agallador Nemátodo de la raíz	<i>Meloidogyne sp</i> <i>Tylenchus sp</i>	3 a 4		
Papa	Nemátodo de los bulbos Nemátodo dorado Nemátodo agallador Nemátodo de la raíz Nemátodo lesionado Nemátodo de la raíz	<i>Ditylenchus sp</i> <i>Globodera</i> <i>Rostochiensis</i> <i>Meloidogyne sp</i> <i>Aphelenchus sp</i> <i>Pratylenchus sp</i> <i>Tylenchus sp</i>	10 a 15		
Soya	Nemátodo del raquitismo Nemátodo lesionado Nemátodo espiral	<i>Tylenchorhynchus sp</i> <i>Pratylenchus sp</i> <i>Helicotylenchus sp</i>	3 a 5		
Tabaco	Nemátodo de la raíz Nemátodo lesionado Nemátodo agallador Nemátodo de la raíz	<i>Aphelenchus sp</i> <i>Pratylenchus sp</i> <i>Meloidogyne sp</i> <i>Tylenchus sp</i>	5 a 10 5 a 6 mL/m ²		
Cacao	Nemátodo lesionado Nemátodo de la raíz	<i>Pratylenchus sp</i> <i>Aphelenchus sp</i> <i>Tylenchus sp</i>	5 a 6 mL/m ² (en viveros)		Trate el suelo antes de lo siembra. riegue después
			150 a 200 ml/ 10L de agua		En plantaciones establecidas aplique asperjando el suelo en el área de goteo, usando 1L/arbusto
Limonero, lima, naranjo, tangerino y toronjo	Nemátodo de la raíz Nemátodo de los bulbos Nemátodo agallador Nemátodo lesionado	<i>Aphelenchus sp</i> <i>Aphelenchoides sp</i> <i>Tylenchus sp</i> <i>Ditylenchus sp</i> <i>Helicotylenchus sp</i> <i>Pratylenchus sp</i>	20ml/L de agua		Asperje 200 ml alrededor de la planta ya trasplantada en el lugar definitivo. Repita a los 3 o 4 meses. No aplicar 180 días antes de la cosecha
Durazno y manzano	Nemátodo de la raíz Nemátodo de los bulbos Nemátodo agallador Nemátodo lesionado	<i>Aphelenchus sp</i> <i>Ditylenchus sp</i> <i>Meloidogyne sp</i> <i>Pratylenchus sp</i>	150 ml/ 10 L de agua	Aplice en cajete o área de goteo, usando 1 L de mezcla por árbol. Última aplicación 45 a 72 días antes de la cosecha	
Piña	Nemátodo anillo Nemátodo espiral Nemátodo agallador Nemátodo lesionado Nemátidos	<i>Criconemoides sp</i> <i>Helicotylenchus sp</i> <i>Meloidogyne sp</i> <i>Pratylenchus sp</i> <i>Criconema sp</i> <i>Rotylenchus sp</i> <i>Tylenchus sp</i> <i>Xiphinema sp</i>	25	Antes de la siembra	
			10	En plantaciones establecidas aplicación al suelo a los 90 150 días.	
Plátano	Nemátodo de la raíz Nemátodo espiral Nemátodo agallador Nemátodo lesionado Nemátodo barrenador Nemátodo del raquitismo	<i>Aphelenchus sp</i> <i>Helicotylenchus sp</i> <i>Meloidogyne sp</i> <i>Pratylenchus sp</i> <i>Radopholus similis</i> <i>Tylenchorhynchus sp</i>	40 a 60 ml/10 L de agua 80 ml/ 10 L de agua	Aplice en aspersión al suelo. 1L/cepa al momento de la aplicación. Asperje en la base de los hijuelos en media luna, previa limpieza de hojarasca. 1 L de mezcla/hijuelo y repitiendo cada 4 a 6 meses	
Vid	Nemátodo lesionado Nemátodos	<i>Pratylenchus sp</i> <i>Criconemoides sp</i> <i>Dikrella sp</i> <i>Heterodera sp</i> <i>Xiphinema sp</i> <i>Erythroneura sp</i> <i>Frankiniella sp</i>	10 a 15 1.0 a 1.5	Aplice durante la brotación en banda a ambos lados, o bien a través del sistema de riego por goteo al suelo. Después de la aplicación regar abundantemente.	
Ornamentales	Nemátodos de la raíz Nemátodo anillo Nemátodo espiral Nemátodo agallador Nemátodo lesionado	<i>Aphelenchus sp</i> <i>Aphelenchoides sp</i> <i>Criconemoides p</i> <i>Helicotylenchus sp</i> <i>Meloidogyne sp</i> <i>Pratylenchus sp</i>	2.5 a 4ml/m ² del suelo	Mezcle con agua y asperje uniformemente el área, posteriormente aplicar un riego No aplique más 2 veces por año.	

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 48 horas

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Calibrar el equipo de aplicación. En un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad de agua, agregar la dosis necesaria del producto y agitar. Posteriormente vaciar esta premezcla al tanque del equipo de aplicación y agregar la totalidad de agua calculada en la calibración. *Las variaciones en las dosis dependen del grado de infestación

CONTRAINDICACIONES

No Aplicar **NEMACUR® 400 CE** sin el equipo de protección personal necesario. En ornamentales no aplicar más de 2 veces al año.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA CON OTROS PRODUCTOS O SUBSTANCIAS.

No mezclar **NEMACUR® 400 CE** con otros productos. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, guantes resistentes a productos químicos, overol de algodón y botas de hule. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o con una solución alcalina. Evite inhalar los vapores o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que durante la aplicación el rocío caiga sobre la piel. Si observa algún malestar durante el trabajo deténgase y llame a un médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para tratamiento. **Si hay contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15 – 20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento. **Si se ingiere:** Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si esta en posibilidad de deglutir. No induzca al vomito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No de nada por la boca a una persona inconsciente. **Si se inhala:** Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SIN TOX LAS 24 HRS (55) 5598-6659, (55) 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:

AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.



An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja

Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010

Tel: (33) 3110 1976

800 00 AMVAC (26822)

HECHO EN MÉXICO



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](#) [in amvac mexico](#)

