



Smartdrop[®]

INSECTICIDA

IMIDACLOPRID + BIFENTRINA

INSECTICIDA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Insecticida de amplios periodos y espectros de control, cuenta con dos modos y mecanismos de acción diferentes por contacto e ingestión, con actividad sistémica (vía raíz) y translaminar (vía follaje). Lo que permite control buen control de ninfas e insectos adulto.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
IMIDACLOPRID: (E)-1- (6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina. (Equivalente a 210 g de i.a./L a 20°C)	18.92
BIFENTRINA: 2-metil-3-fenilbencil (1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 72 g de i.a./L a 20°C)	6.49
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, humectante, anticongelante, estabilizante, conservador y diluyente.	74.59
TOTAL	100.0

Registro No.: RSCO-MEZC-INAC-1101N-X0013-064-25.41

INSTRUCCIONES DE USO

SMARTDROP® es recomendado para el control de las plagas indicadas en el siguiente cuadro:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Limonero (SL)* Lima (SL) Mandarino (SL) Naranja (SL) Tangerino (SL) Toronjo (SL)	Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	45-50 ml/100 L de agua	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha.

() **Intervalo de seguridad:** Número de días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Para mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Llene el tanque de mezclado a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad necesaria de **SMARTDROP®** complete con agua hasta el nivel deseado y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación. Volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha.

CONTRAINDICACIONES: No se debe aplicar en horas de calor muy intensos ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con lo recomendado en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorras de algodón o sombrero, mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, guantes resistentes a químicos, overol de algodón y botas de hule. Llene los recipientes de los equipos siempre a favor del viento, evitando derrames. Mezcla con agitador de madera u otro material parecido. No trate de destapar las boquillas con la boca. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Después de una jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia. El producto sobrante consérvelo en su envase original, manteniendo este bien cerrado y en un lugar bajo llave. Una vez vacío el envase, no vuelva a utilizarlo; destrúyalo.

PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado y abrigándola bien. Consiga atención médica inmediatamente. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si el producto cae en los ojos, lávese por lo menos durante 15 minutos con agua limpia. Si el producto cae sobre la piel, lave la parte afectada con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si el producto ha sido ingerido, NO PROVOQUE EL VÓMITO; en caso de ser necesario, provocarlo bajo supervisión médica, introduciendo el dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Los ingredientes activos de este producto pertenecen a los grupos químicos de neonicotinoides (Imidacloprid) y de los piretroides (Bifentrina). 5

Signos y síntomas de intoxicación:

Por vía oral y cutánea, se absorben rápidamente provocando además de los anterior, y dependiendo de la cantidad absorbida, alteraciones del S.N.C. y periférico. Por inhalación ocasionan rinitis alérgica, congestión y escurrimiento nasal, dificultad respiratoria súbita, inflamación de la boca y laringe, choque anafiláctico, reacción pulmonar alérgica, parestesias en lengua, labios y párpados, rara vez temblores y dificultad para la marcha.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO

Intoxicación por vía cutánea, al paciente con abundante agua y jabón. Tratar el asma o la anafilaxia con adrenalina al 1:1000 aplicando 0.1 a 0.5 ml I.M. o I.V. muy lentamente, repetir si es necesario. Aplicar hidrocortisona o equivalente 50-100 mg I.V. Manejar la rinitis con antihistamínicos y descongestionantes V.O. en caso de ingestión, lavar el estómago, administrar carbón activado 1 a 2 g/kg de peso en dilución 1 a 5 seguido de sulfato de sodio 250 mg/kg de peso disuelto en agua como catártico, repetir el carbón activado cada 6 hr por 24 horas según la cantidad del tóxico ingerido. Tratar los síntomas del sistema nervioso con Dizepam 5-6 mg en adultos y 0.1 mg/kg en niños.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SIN TOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:

AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.



An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010

Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)

HECHO EN MÉXICO



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](https://www.facebook.com/amvacmexico) [in amvac mexico](https://www.linkedin.com/company/amvac-mexico)